1° CONGRESSO NAZIONALE
convatec STOMIA
Prendersi cura, costruire evidenze

Riduzione delle infiltrazioni e gestione delle pieghe cutanee in un paziente con ileostomia retratta grazie a Esteem Body™ con Leak Defence™

Valentina Visciola | *Ospedale Santa Rosa, Viterbo*

Background

> DESCRIZIONE DEL CASO:
Paziente di anni 62, sottoposto a intervento di emicolectomia destra con confezionamento di ileostomia terminale a causa di una neoplasia.
A tre mesi dall'intervento, si osserva una progressiva retrazione dello stoma, che si presenta ora al di sotto del piano cutaneo di circa 3 mm.

> PROBLEMATICA:
Presenza di profonde pieghe cutanee nell'emicorpo inferiore e frequenti episodi di infiltrazione sotto la placca (fino a 3 volte al giorno).
Tale condizione ha causato una severa lesione cutanea peristomale.

> MOTIVAZIONE DEL CAMBIO DISPOSITIVO:
Necessità di trovare una convessità adeguata che permetta di far emergere lo stoma, stabilizzare la cute peristomale riducendo le pieghe e prevenire il distacco precoce del presidio.

Obiettivo dell'intervento

L'obiettivo primario è azzerare il passaggio di effluenti sotto l'adesivo per permettere la guarigione della cute.

- Appianare le pieghe cutanee addominali per creare una superficie di adesione uniforme.
- Applicare una convessità soft ma efficace, evitando tensioni eccessive che potrebbero causare traumi o ulcere.
- Compensare l'asimmetria dell'addome e la retrazione dello stoma.

Metodo / Approccio clinico

> TIPO DI STOMIA E CONDIZIONI INIZIALI:
Ileostomia retratta (3 mm sotto il livello cutaneo) posizionata in un avvallamento dell'addome. Cute peristomale fortemente compromessa (lesione da umidità di grado moderato-severo).

> CONVESSITÀ SCELTA:
Sacca monopezzo convessa Esteem Body™ con Leak Defence™, con profondità di 7mm e tensione periferica per esercitare la giusta tensione mirata nei punti di tensione periferici.

> IDROCOLLOIDE UTILIZZATO:
Applicazione ESENTA™ Stomahesive® polvere per gestire le lesioni umide, seguita da ESENTA™ Stomahesive® anello per sigillare i margini dello stoma.

> FOLLOW-UP DEL PAZIENTE:
Monitoraggio a 7, 14 e 28 giorni dall'inizio del trattamento.

Risultati clinici

> RIDUZIONE INFILTRAZIONI:
Totale azzeramento degli episodi di infiltrazione fin dalla prima applicazione del nuovo dispositivo.

> MIGLIORAMENTO LESIONI:
Risoluzione completa dell'eritema e riepitelizzazione della cute peristomale entro i primi 14 giorni di utilizzo.
Aumento del tempo di tenuta:
Rispettato il tempo di tenuta del dispositivo

> FEEDBACK DEL PAZIENTE:
Il paziente ha riferito una drastica riduzione del dolore e dell'ansia legata al rischio di distacchi improvvisi, manifestando un netto miglioramento della qualità della vita e una ritrovata autonomia nella gestione.

Discussione

> PERCHÉ LA COMBINAZIONE HA FUNZIONATO:
La combinazione tra i punti di tensione e la profondità e la tecnologia Leak Defence™ ha permesso di spingere delicatamente verso l'esterno lo stoma retratto.
Al contempo, la flessibilità del presidio ha assecondato i movimenti delle pieghe cutanee senza creare fessure.

> IMPORTANZA DELLA MINIMA CONVESSITÀ:
L'utilizzo di una convessità non eccessiva ha evitato complicanze da pressione, garantendo comunque la tenuta idraulica necessaria.

> CRITICITÀ RESIDUE:
Nessuna criticità rilevante riscontrata alla fine del follow-up; si raccomanda la prosecuzione dei controlli ambulatoriali a cadenza trimestrale.

Conclusioni

> VALORE DI ESTEEM BODY™ CON LEAK DEFENCE™ PER IL CASO:
Il dispositivo si è dimostrato una soluzione terapeutica e assistenziale di alto livello per la gestione di stomi complessi e retratti.

> BENEFICI PER IL PAZIENTE:
Maggiore comfort, eliminazione del dolore cutaneo, incremento del tempo di utilizzo del presidio e recupero della sicurezza personale.

> BENEFICI PER L'OPERATORE:
Ottimizzazione dei tempi assistenziali, riduzione degli accessi ambulatoriali d'urgenza e semplificazione della procedura di educazione terapeutica del paziente.