1° CONGRESSO NAZIONALE
convatec STOMIA
Prendersi cura, costruire evidenze

L'importanza di conoscere lo strumento S.A.C.S.™ Evolution

Personalizzazione del presidio e continuità assistenziale nella gestione delle infiltrazioni: un caso della rete StomaLink Napoli

Ciro Leggittimo | *OPI Napoli - StomaLink: Rete degli Ambulatori di Stomaterapia della Provincia di Napoli*

Background

Paziente donna di 70 anni, sottoposta in regime di urgenza a confezionamento di stomia a causa di una stenosi neoplastica, presso una struttura privata accreditata.

Nel decorso post-operatorio, la paziente ha sviluppato un'infezione a livello della sede di sutura, esitata in un parziale distacco muco-cutaneo.
A circa 10 giorni dall'intervento, a seguito delle dimissioni protette, la paziente è stata tempestivamente indirizzata presso l'Ambulatorio di Stomaterapia dell'AORN Cardarelli.

Dopo un iniziale colloquio di counseling infermieristico, è stata eseguita la valutazione da stomoterapista, dove evidenziavo secondo S.A.C.S.™ Evolution L4 in T5.

Obiettivi dell'intervento

> Ripristino dell'integrità cutanea: Perseguire la completa risoluzione della lesione peristomale, mirando al raggiungimento dello stato di cute integra secondo la classificazione S.A.C.S.™ Evolution.

> Ottimizzazione del sistema di raccolta: Selezionare il dispositivo di convessità più idoneo al fine di prevenire infiltrazioni e garantire soprattutto la tenuta del presidio, in considerazione dell'elevato livello di essudato presente.

> Addestramento e supporto al caregiver.

Metodo


L4 in T5 - Prima valutazione

Viene modificato il dispositivo precedentemente utilizzato e applicato:

- Esteem Body™ con Leak Defence™ 7 mm - 10-35 mm
- ESENTA™ Rimuovi Adesivo Spray
- ESENTA™ Film Protettivo Spray (28ml)
- ESENTA™ Stomahesive® Polvere
- AQUACEL Ag Plus
- ESENTA™ Stomahesive® Pasta

Si osserva un evidente miglioramento clinico, con riduzione dell'essudato e delle infiltrazioni e conseguente miglioramento della tenuta del presidio. Si ripete la medicazione ogni due giorni.

Risultati clinici



Al follow-up effettuato ogni due giorni, si osserva un miglioramento delle condizioni cliniche e minore quantità di essudato. La paziente riferisce minore sofferenza, riduzione del bruciore e maggiore sicurezza nella gestione della stomia. La condizione cutanea risulta migliorata.
La completa guarigione è avvenuta in circa 50 giorni. Dunque, secondo S.A.C.S.™ Evolution, la lesione è stata classificata in L0TV.

Parametro	T0	+2 settimana	+4 settimane	+7 settimane
Infiltrazioni	Presenti	Ridotte, ancora presenti	In ulteriore riduzione	Assenti
Cute peristomale	Irritazione/lesioni	Miglioramento	Ulteriore miglioramento	Integra
Bruciore/sofferenza	Importante	Ridotto	Ulteriore riduzione	Risolto
Autonomia	Assente	Maggiore partecipazione (con caregiver)	Maggiore partecipazione (con caregiver)	Maggiore partecipazione (con caregiver)

Il percorso assistenziale, sviluppato nell'arco di circa 7 settimane, ha evidenziato una progressiva riduzione delle infiltrazioni e della compromissione cutanea, fino alla loro completa risoluzione

S.A.C.S. ™ Evolution è stato utilizzato per documentare la condizione cutanea nei diversi momenti del percorso.

Discussione

Il caso clinico descritto evidenzia come la gestione delle complicanze peristomali severe richieda un approccio sinergico, capace di coniugare il trattamento avanzato della ferita (wound care) e l'ottimizzazione del sistema di raccolta.
La presenza iniziale di un distacco muco-cutaneo infetto, associata a una severa compromissione cutanea classificata come SACS L4-T5, ha imposto una strategia d'intervento tempestiva e stratificata. In questa complessa topografia assistenziale, l'utilizzo del dispositivo Esteem Body™ 7 mm (10-35 mm) ha rappresentato il fulcro della stabilità meccanica. La tecnologia Leak Defence™, abbinata a una convessità mirata, ha permesso di esercitare una pressione controllata in prossimità dello stoma, isolando i margini del distacco muco-cutaneo e impedendo alle feci di infiltrarsi sotto la barriera.

Conclusioni

La gestione tempestiva delle complicanze stomali è determinante per preservare l'integrità cutanea e la stabilità del sistema di raccolta. L'integrazione di wound care avanzato e protezione cutanea con prodotti ESENTA™ ha favorito il controllo dell'infezione, la rigenerazione tessutale e il recupero della cute integra in circa 50 giorni. Il counseling infermieristico e l'addestramento del caregiver si sono rivelati elementi chiave per il raggiungimento dell'autonomia gestionale e il ritorno alle attività quotidiane.