1° CONGRESSO NAZIONALE
convatec STOMIA
Prendersi cura, costruire evidenze

Gestione di un distacco muco-cutaneo in paziente con ileostomia mediante applicazione della routine ESENTA™ in 4 gesti di cura

Irene Marra | *Ospedale Cardinale G. Panico di Tricase*

Background

Paziente con ileostomia Problema clinico
- Distacco muco-cutaneo
- Tenuta dispositivo
- Infiltrazioni

Obiettivo dell'intervento

Ripristino della giunzione muco-cutanea per facilitare la gestione del presidio ed evitare insorgenza di ulteriori complicazioni.

Approccio Clinico

ROUTINE APPLICATA

> GESTO 1 - PREPARAZIONE
- ESENTA™ STOMAHESIVE® POLVERE
- ESENTA™ FILM PROTETTIVO

> GESTO 2 - APPLICAZIONE
- ESENTA™ STOMAHESIVE® ANELLO

> GESTO 3 - SICUREZZA
- ESENTA™ STRISCE IDROCOLLOIDALI XL

> GESTO 4 - RIMOZIONE
- ESENTA™ RIMUOVI ADESIVO

Risultati



Dopo 20 giorni
- Risoluzione della complicanza
- Miglioramento della cute peristomale
- Miglior tenuta del dispositivo, con passaggio da 2 pezzi a monopezzo

Discussione

La combinazione dei quattro gesti ha permesso di affrontare simultaneamente protezione cutanea, stabilità del dispositivo e rimozione atraumatica.
In particolare, l'utilizzo dell'anello al fine di isolare la stomia ed evitare che gli effluenti si infiltrassero anche nei tessuti sottostanti, ha permesso di evitare infezioni ed altre possibili complicanze.

Conclusioni

Una routine strutturata di cura può contribuire al miglioramento della salute cutanea e dell'esperienza del paziente.

Parole chiave e Bibliografia

ESENTA™, cute peristomale, protezione cutanea, rimozione atraumatica

---

Down G, Hansen AS, et al. Clinical preventive-based best practices to reduce the risk of peristomal skin complications: an international consensus report. WCET Journal. 2023;43(1):11-19.
WCET®. International Ostomy Guideline. Third Edition.