1° CONGRESSO NAZIONALE
convatec STOMIA
Prendersi cura, costruire evidenze

# Utilizzo di una tensione centralizzata in una stomia introflessa con distacco cutaneo

Rosanna Luciano | *AORN Moscati, Avellino*

## Background

Deiscenza mucocutanea di ileostomia in paziente già sottoposta a laparotomia esplorativa e confezionamento di ileostomia per deiscenza anastomotica

Pregresso ictus cerebrale, Fibrillazione atriale, diabete mellito, laparotomia esplorativa per ileo biliare, laparotomia esplorativa per occlusione intestinale, laparotomia esplorativa, toilette addominale e confezionamento di ileostomia in seguito a peritonite secondaria a deiscenza anastomotica.

## Obiettivo dell'intervento

Estroflessione dello stoma applicando tensione centralizzata con Esteem Body™ con Leak Defence™ con profondità 7mm e Punto di tensione 40mm.

Si rende necessario l'uso della pasta idrocolloidale vista l'irregolarità della cute peristomale.

## Approccio Clinico

> Tipo di stomia e condizioni cutanee iniziali:
ileostomia con irregolarità della cute peristomale

> Convessità scelta: Esteem Body™ con Leak Defence™
Profondità 7mm Punto di tensione 40mm

> Idrocolloide utilizzato: Durahesive+ pasta idrocolloidale.

> Follow-up del paziente: Ogni due giorni per 5 settimane.

## Risultati

- Azzeramento infiltrazioni
- Guarigione della cute peristomale
- Aumento del tempo di tenuta

## Discussione e Conclusioni

La combinazione di profondità , punti di tensione e l'uso degli accessori hanno contribuito alla risoluzione del caso in esame applicando sulla cute peristomale la minima convessità necessaria, portando alla risoluzione completa del caso,-quindi L0 (cute integra) a distanza di 50 giorni.

1




2



3



4



5



## Parole chiave

Esteem Body™ - convexity - Leak Defense™ - infiltrazioni - cute peristomale - caso clinico