1° CONGRESSO NAZIONALE
convatec STOMIA
Prendersi cura, costruire evidenze

Gestione efficace delle infiltrazioni e stabilizzazione della cute peristomale in stomia retratta tramite dispositivo Esteem Body™ con tecnologia Leak Defence™

Maria Costa | *Ospedale S. Carlo, Roma*

Background

paz di aa 64 con diagnosi di diverticolite complicata e perforazione del sigma

IC sec Hartmann e confezionamento di colostomia fianco sn.
In anamnesi la paz ha eseguito IC bariatrico sleeve gastrectomy e conseguente addominoplastica. Il post operatorio si complica per la presenza di fistola enterica >resezione ileale subisce diversi interventi addominali, si applica bogota'bag ,alla rimozione difficile accostamento dei margini fasciali chiusura parete con protesi bio. Deiscenza della ferita vac terapy.

La gestione della stomia si complica per retrazione della stessa 5 mm al di sotto del piano cutaneo, difficoltà ad apparecchiare per la ferita produttiva e pieghe addominali con conseguente infiltrazioni sotto la placca e distacco del dispositivo causando di conseguenza lesioni peristomali dolorose.

> MOTIVAZIONE DEL CAMBIO DISPOSITIVO.
La conseguente perdita di aderenza dei dispositivi con barriera cutanea piana ha reso indispensabile il cambio di presidio, orientando verso una soluzione convessa in grado di garantire stabilità della cute peristomale e tenuta del presidio prevenendo il distacco precoce.

Obiettivi del caso

- Eliminare le infiltrazioni di effluenti al di sotto del dispositivo di raccolta, permettere la guarigione della cute
- Promuovere la guarigione e la stabilizzazione della cute peristomale danneggiata, riducendo l'infiammazione
- Individuare la minima convessità necessaria per garantire l'estroflessione dello stoma evitando traumi o ulcere da pressione
- Ottimizzare l'adesione del presidio e compensare la retrazione dello stoma

Metodo

Stomia retratta 5mm situata in avvallamento cutaneo con presenza di pieghe dinamiche e medicazione della ferita mediana. Cute peristomale compromessa con lesioni erosiva

Scelta del dispositivo Esteem Body™ con convessità mirata a profilo studiata per applicare una tensione calibrata. Utilizzo di ESENTA™ Stomahesive® Polvere per favorire la protezione cutanea e l'assorbimento dell'umidità residua e ESENTA™ Stomahesive® Anello per garantire un'adesione sicura livellando i contorni irregolari.

Monitoraggio programmato ogni 7gg con rivalutazione fotografica e clinica dello stato cutaneo e dei tempi di permanenza del presidio.

Risultati clinici

- Riduzioni infiltrazioni>ridotti episodi di infiltrazioni e poi azzeramento degli episodi di infiltrazioni con l'applicazione del nuovo dispositivo
- Miglioramento delle lesioni>risoluzione dell'eritema ed essudato
- Aumento del tempo di tenuta:
- Il tempo medio di utilizzo del dispositivo è passato da poche ore a 4gg
- Feedback del paziente: il paz ha riferito riduzione del dolore e riduzione dell'ansia dovuta al distacco improvviso conducendo il paz ad una condizione di autonomia nella gestione

Discussione

> PERCHÉ LA COMBINAZIONE DI PROFONDITÀ E PUNTI DI TENSIONE HA FUNZIONATO
La gestione di una stomia retraente richiede un approccio individualizzato che tenga conto non solo della profondità della stomia, ma anche della morfologia della parete addominale e della presenza di pieghe.

> QUANTO È STATO IMPORTANTE SCEGLIERE LA MINIMA CONVESSITÀ NECESSARIA
La curvatura sul lato della barriera cutanea ha favorito l'estroflessione dello stoma

Conclusioni

Il caso evidenzia l'importanza di una valutazione della morfologia della parete addominale e dello stoma nella scelta del sistema di raccolta.

L'impiego di presidio convesso Esteem Body™ con Leak Defence™ ha portato miglioramento nella gestione della stomia complicate da lesioni da infiltrazioni da effluenti migliorando la sicurezza e la gestione quotidiana del paziente.

Al fine di prevenire le complicanze della cute peristomale il dispositivo convesso è consigliato fin dal post operatorio.

L'uso appropriato del device e utilizzo di prodotti specifici migliorano la qualità di vita del paziente e favoriscono il processo di apprendimento nella gestione autonoma della sua condizione.