1° CONGRESSO NAZIONALE
convatec STOMIA
Prendersi cura, costruire evidenze

Gestione di stomia complicata da deiscenza e distacco muco-cutaneo: prevenzione delle infiltrazioni

Roberto Russo | *Coordinatore Infermieristico U.O.C. Chirurgia Generale ed U.O. Urologia*
Regione Siciliana - Azienda Sanitaria Provinciale - Presidio Ospedaliero S.marta E S.venera - Acireale

Background

Le complicanze stomali precoci, quali **deiscenza della ferita chirurgica e distacco della giunzione muco-cutanea**, possono determinare irregolarità della superficie peristomale, compromettendo l'adesione del dispositivo di raccolta e aumentando il rischio di infiltrazione dell'effluente, danno cutaneo e riduzione del tempo di tenuta del sistema.

> PRESENTAZIONE DEL CASO
Donna di 70 anni sottoposta a intervento chirurgico per carcinoma del colon con confezionamento di stomia.

Nel decorso post-operatorio si osservavano:
- deiscenza della ferita chirurgica;
- distacco muco-cutaneo peristomale;
- irregolarità della superficie cutanea;
- difficoltà di adesione del dispositivo;
- elevato rischio di infiltrazione dell'effluente.

> VALUTAZIONE STOMALE E PERISTOMALE
L'assessment evidenziava:
- distacco muco-cutaneo della stomia
- superficie peristomale irregolare
- ridotta adesione della placca
- rischio di infiltrazioni e macerazione cutanea
- necessità di protezione della cute e di miglioramento della tenuta del sistema



Obiettivi assistenziali

- Proteggere la cute peristomale.
- Ridurre il rischio di infiltrazioni.
- Compensare le irregolarità della superficie cutanea.
- Migliorare l'aderenza del dispositivo.
- Aumentare la durata di utilizzo del sistema.
- Migliorare comfort e sicurezza della paziente.
- Consentire il monitoraggio dell'evoluzione del distacco muco-cutaneo.

Approccio Clinico

> INTERVENTO
Dopo una valutazione specialistica della stomia e della cute peristomale è stato adottato un approccio finalizzato alla gestione delle irregolarità anatomiche e alla prevenzione delle infiltrazioni.

> PROCEDURA
- Detersione e asciugatura accurata della cute.
- Valutazione del distacco muco-cutaneo.
- Applicazione di **anello idrocolloidale** per colmare il dislivello e uniformare la superficie peristomale.
- Posizionamento di **Esteem Body™ con Leak Defence™ con Profondità 7 mm** e **Tensione Periferica**
- Verifica dell'aderenza e della tenuta del dispositivo.
- Follow-up clinico della cute e della giunzione muco-cutanea.





> RAZIONALE DELLA SCELTA
L'anello idrocolloidale è stato utilizzato per:
- compensare le irregolarità della superficie peristomale;
- ridurre gli spazi potenzialmente esposti all'effluente;
- favorire una migliore adattabilità del sistema di raccolta.

La combinazione di **Profondità da 7mm e Tensione Periferica** è stata scelta per migliorare il contatto tra dispositivo e cute, supportando la tenuta del sistema in presenza di alterazioni morfologiche peristomali.
.

Follow up

Durante i controlli successivi sono stati monitorati:
- evoluzione del distacco muco-cutaneo;
- condizioni della cute peristomale;
- eventuali infiltrazioni;
- durata e performance del dispositivo;
- presenza di dolore, sanguinamento o secrezioni;
- comfort della paziente;
- capacità di gestione autonoma del sistema.

Take Home Message

- Valutare sempre la morfologia peristomale.
- Compensare precocemente i dislivelli cutanei.
- Prevenire l'infiltrazione per proteggere la cute.
- Personalizzare la scelta della convessità in base alle caratteristiche cliniche del paziente.