1° CONGRESSO NAZIONALE
convatec STOMIA
Prendersi cura, costruire evidenze

Dalla lesione alla risoluzione: l'efficacia della routine ESENTA™

Antonella Miggianu | *ARNAS G. Brotzu, Cagliari*

Background

Donna, 84 aa, portatrice di ileostomia su bacchetta.
Al settimo giorno p.o., dopo la rimozione della bacchetta di sostegno, si osserva una lesione lineare di circa 0,8 mm nel punto di inserzione della bacchetta tra T1 e T4 con modesto sanguinamento da contatto.

La stomia appare:

- rossa e ben perfusa;
- funzionante con effluente enterico;
- senza necrosi o retrazione;
- senza deiescenza circonferenziale;
- senza secrezione purulenta o segni sistemici di infezione.

La complicanza viene classificata come separazione muco cutanea parziale, superficiale, post traumatica con iperemia circonferenziale a livello della cute peristomale in tutti i quadranti (TV).

Il trattamento in questo caso è mirato alla risoluzione della lesione causata dalla bacchetta e della lesione iperemica.

Trattamento

In base alla valutazione stomaterapica si procede con:

- detersione accurata con soluzione fisiologica e asciugatura della cute circostante;
- utilizzo di ESENTA™ Stomahesive® Polvere sul margine umido fissata con ESENTA™ Film protettivo
- applicazione di ESENTA™ Stomahesive® Anello per colmare le irregolarità e prevenire le infiltrazioni;
- placca ritagliata con precisione senza lasciare cute esposta all'effluente;
- utilizzo di ESENTA Diamonds™ per gestire output;
- nella cavità si applica sottile striscia di idrofibra (Aquacel® Ag+ Extra);
- copertura con idrocolloide e sistema di raccolta due pezzi convesso.
- ad ogni cambio del sistema di raccolta si utilizza lo spray Esenta™ Rimuovi adesivo;

Controllo ogni 48/72 ore per valutare ampiezza della lesione, profondità, dolore, segni di infezione, tenuta della placca.





Risultati

Dopo tre settimane di trattamento si osserva la completa chiusura del difetto con continuità tra mucosa stomale e cute circostante, epitelizzazione completa della superficie, assenza di essudato, eritema, dolore, stomia rosea vitale e funzionante, assenza di infiltrazioni e buona tenuta del dispositivo di raccolta.

Si prosegue nell'utilizzo di film protettivo e rimuovi adesivo Esenta per la sostituzione del presidio.
In seguito alla risoluzione del problema si sostituisce il sistema due pezzi con un monopezzo convesso soft.

Discussione e Conclusioni

L'utilizzo combinato di accessori e sistema due pezzi, garantendo una salda tenuta, ha favorito una rapida guarigione della lesione e dell'eritema peristomale, permettendo alle medicazioni sottostanti di agire nei tempi dovuti.